

克稗[®]

除草劑

克稗[®] Clincher[®]

10% 乳劑

除草劑

產品特性

- 對水稻不易產生藥害影響。
- 僅水稻雜草，可用於秧田、直播稻和移植稻。
- 莖葉吸收快，耐雨性佳，施藥三小時後下雨不影響藥效。
- 環境中殘留短，對輪作物風險較低。

克稗[®] Clincher[®] 除草劑

作用機制：A

有效成分：丁基賽伏草 (Cyhalofop-butyl)

產品特性

- 殺草譜廣，可防除千金子、雙穗雀稗、稗草、馬唐和狗尾草等禾本科雜草。

注意事項

- 克稗是莖葉處理劑，藥液直接噴到雜草莖葉上才能發揮藥效。
- 莖葉噴霧霧滴要細，噴霧要均勻。
- 施藥前排水，使雜草莖葉 2/3 以上露出水面，施藥後 24 小時至 72 小時內灌水。
- 請勿與闊葉除草劑混用，以避免影響本藥劑之藥效。
- 本劑對闊葉草、莎草科無效，建議於用藥前或用藥後 7 天使用闊葉除草劑。

作用機制

- 噴藥後 1-2 天生長停止
- 引起黃化/褐化/死亡 (幼嫩葉 → 老葉)
- 3-5 葉稗草約 2-3 週死亡 (高溫死亡時間縮短)

影響藥效的因素

- 用藥量/雜草葉齡
- 噴霧品質
- 用藥後很快 3 小時內下雨
- 混用了不應混用的藥劑
- 雜草生長受外來壓力 (如乾旱)

吸收部位—莖葉生長點
↓
作用機制—阻礙脂肪酸合成
↓
症狀—生長停止
↓
枯死



千金子



稗草



芒稷



雙穗雀稗